

IP vaksinasjonsmanual rognkjeks



Denne manualen er basert på vår erfaring og inneholder generell informasjon om IP-vaksinering av rognkjeks med våre produkter. Den er kun ment til informasjonsformål og bør ikke brukes til å erstatte råd og anbefalinger gitt av behandlende fiskehelsepersonell. Den er heller ikke ment som erstatning for pakningsvedlegget som følger våre vaksiner, det er viktig å lese disse siden anbefalingene kan variere for forskjellige produkter. Informasjonen i denne manualen erstatter ikke helt eller delvis andre anbefalinger gitt av forskrivende fiskehelsepersonell angående vaksinering.

Kontakt oss gjerne ved spørsmål angående vaksinering.

Innhold

Kontroll av vaksiner ved mottak	2
Vaksinering.....	3
Før vaksinering.	3
Oppkobling av vaksine	3
Stikkpunkt.....	6
Nålestørrelse	6
Selvinjeksjon	8
Generelt.....	8
Forbyggende tiltak	8
Du har stukket deg, hva nå?.....	9
Førstehjelp ved alvorlig allergisk reaksjon etter selvstikk	9
Informasjon til lege	10
Etterkontroll.....	11
Umiddelbart etter vaksinering	11
Kontroll av bivirkninger før sjøutsett	11
Veileder for scoring av bivirkninger	11
Lokalisering av adheranser	11
Vaksinerester	12
Beskrivelse av gradering/scoring adheranser fra 0 til 6	12
Melanin organ.....	13
Melanin bukhinne/muskel.....	13
Vedlegg	
Mottakskontroll.....	i
Kontroll ved oppstart vaksinering	ii
Evaluerer vaksineresaksjon rognkjeks	iii
IP-vaksinering rognkjeks.....	iv


Kontroll av vaksiner ved mottak

Det er viktig å sjekke at leveranser er i henhold til bestilling. Punkter som bør kontrolleres er:

1. Temperatur under transport. Det er viktig at vaksinen er blitt holdt kjølig både ved lagring og transport (2-8 °C).
2. Leveransen er riktig mht. vaksintype og antall doser.
3. Vaksinepakningene er ubrutt ved ankomst.
4. Vaksines utseende ved mottak (se bilde 1A-C nedenfor).
5. Holdbarhet. Dette er viktig for å sikre kvaliteten på emulsjon.
6. Sjekk batchnummer på flasken/posen og sikre sporbarhet.

Vaksiner skal oppbevares i kjøleskap frem til vaksinering. Det er viktig at vaksinen ikke blir utsatt for frost.

Benytt kontrollskjema ved mottak. Mottaksskjemaet (finnes i vedlegg) er ment som et forslag. Ved tvil ta gjerne kontakt med oss eller forskrivende fiskehelsepersonell.



Bilde 1. A) Et tynt lag med olje øverst er normalt etter lagring. B) Emulsjonssprekk. C) Homogen vaksine klar til bruk.

Vaksinering

Før vaksinering.

Anbefalt minimumsstørrelse for vaksinering av rognkjeks er 6 gram på individnivå. Fisk som skal vaksineres må være frisk og fri for parasitter og sår. Er man i tvil på utfallet av vaksinering kan man vaksinere en liten gruppe fisk først, observere de og ta en vurdering etter en uke. Dette kan være lurt hvis ny vaksine skal tas i bruk. Vi anbefaler at fôr tilbakeholdes i 24 timer før vaksinering. For rognkjeks bør temperatur i vann være mellom 4-12 °C ved vaksinering med våre vaksiner. Vaksiner bør tas ut av kjøleskap i god tid før vaksinering, slik at vaksinen er romtemperert ved oppstart.


Før oppstart må alle vaksiner sjekkes nøye for emulsjonssprekk (bilde 1B). Vaksinen skal ristes godt før bruk, ferdig oppristet vaksine er homogen hvit/kremhvitt (bilde 1C). Ved lagring kan vaksinen skille seg (bilde 1A). Misfarging kan tyde på at vaksinen er ødelagt (emulsjonssprek som vist på bilde 1B).

Oppkobling av vaksine

Beskyttelseslokk i aluminium fjernes før slangesettet kobles på ved å presse spissen på slangesettet (spiken) inn i midten av gummikorken på flaksen. Åpnet vaksine skal lagres kjølig og brukes innen 12 timer.




Bilde 2. Beskyttelseslokk fjernes og spiken på slangesettet stikkes inn i midten av gummikorken.




Bilde 3. Det er viktig at lufteventilen på slangesettet er åpen som demonstrert på bilde. Dette gjelder bare for flasker. Hvis vaksinen er i pose, skal ventilen på slangesett være lukket.

Ved bruk av vaksiner i flasker er det viktig at lufteventilen er åpen. Luftbobler må ikke forekomme i slangesettet siden dette kan føre til ujevn dosering. Sterilt slangesett skal benyttes og samme slange skal ikke benyttes mer enn en dag.



Bilde 4. Luftbobler må ikke forekomme i slangesettet. Vaksinerings kan begynne når disse er fjernet.


Enden på slangesettet kobles til bakende av vaksinasjonspistol. For å sikre at nøyaktig vaksinedose blir injisert i hver fisk er det viktig at vaksinasjonspistoler er kalibrert. Vi anbefaler at man kalibrer pistoler ved oppstart og minst to ganger i løpet av vaksinasjonsøkten. Dette kan gjøres ved at en 1 ml sprøyte kobles til injeksjonsenheten. Trykk deretter ut 10 doser og sjekk at mengde vaksine i sprøyten er 0,5 ml.



Bilde 5. A) Slange oppkoblet til pistol. B) kalibrering av pistol med en 1 ml sprøyte.

Stikkpunkt

Anbefalt stikkpunkt på rognkjeks er i midtlinjen midt mellom bakkant sugekopp og gatt (Bilde 6). Det er viktig at nålen stikkes i midtlinje siden det er der bukveggen er på sitt tynneste (bilde 7A). Vaksinepistolen må ikke trykkes hard ned mot fiskens buk, dette øker sannsynligheten for at vaksinen blir deponert i organer.




Bilde 6. Anbefalt stikkpunkt.

Nålestørrelse


Nålelengde tilpasses fiskens størrelse. Den bør være så kort som mulig, men likevel lang nok til at vaksinen deponeres fritt i bukhalen. Hele skråen på nålen skal være på innsiden av bukveggen med en avstand på 1-2 mm fra nedre kant av skrånningen skråen til bukvegg. Hvis nålen er for kort kan vaksinen bli deponert i bukveggen, dette kan forårsake akutt dødelighet. Hvis man er usikker på hvilken nålelengde man skal bruke så kan man avlive noen fisk, vaksinere og åpne for å se at vaksinen er deponert riktig. Da kan man også sammenligne kanylens lengde med tykkelse på bukveggen. Tabellen under er en veiledning for hvilken nålestørrelse man bør bruke med hensyn til fiskens vekt. Nål bør skiftes når den er uskarp eller skadet, normalt etter vaksinering av 2000 fisk.

Vekt	Lengde
5-7 g	3-4 mm
8-15 g	4-5 mm
14-18 g	5-6 mm
19-30 g	6 mm
> 30 g	7 mm



Bilde 7. A) Nålen skal injiseres i tilnærmet 90 graders vinkel i midtlinjen. Buksnittet på bilde 7A er av en 11 grams fisk som er stukket med en 5 mm nål. **B)** Hele skråen på nålen skal være på innsiden av bukveggen. Vi anbefaler at det er 1-2 mm mellom bukvegg og skråen.

Det er viktig å ha et godt grep om fisken slik at den er rolig under vaksinerings. Dette vil redusere risikoen for feilstikk og selvinjeksjon. Behovet for bedøvelse av rognkjeks ved vaksinerings variere fra anlegg til anlegg så forhør deg med forskrivende fiskehelsepersonell om deres anbefalinger.



Bilde 8. Ha et godt fingergrep om fisken.

Selvinjeksjon

Generelt

Våre vaksiner er ment for injeksjon av fisk og inneholder formalininaktiverte bakterier, samt oljeadjuvans. Vanlig dose er 0.05-0.1 ml. For å forhindre selvinjeksjon anbefaler vi at vaksinatørene bruke hansker som øker friksjon mot fisken. Selvinjeksjon i fingre eller hånd kan likevel forekomme.

Hvis hele dosen (0.05-0.1 ml) injiseres kan et alvorlig sykdomsforløp oppstå hvis ikke riktig behandling blir iverksatt. Den skadde operatøren må oppsøke lege raskt for behandling.

Denne brosjyren inneholder informasjon om forbyggende tiltak for å minimalisere risiko for selvinjeksjon, informasjon til operatør ved selvstikk, samt et informasjonsskriv til lege.

Forbyggende tiltak

1. Grundig opplæring i vaksinasjonsteknikk.
2. Vaksinepersonell bør være kjent med prosedyrer for sikkerhet og tiltak ved selvstikk.
3. Bruk av hansker for å øke friksjon og sikre et best mulig grep på fisken under vaksinering.
4. Behagelig arbeidsstilling og godt med lys.
5. Sikkerhet før tempo. Ha et tempo som sørger for god sikkerhet for vaksinatør.
6. Sikre at fisken er godt bedøvet for å begrense sprelling under vaksinering.
7. Lokal lege kan gjerne varsles i forkant av vaksinasjonsoppstart. Send gjerne med kopi av denne prosedyreanbefalingen.
8. Ha en etablert beredskapsplan.
9. Ved automatisk vaksinasjon med maskin må alltid produsentens anbefalinger for å forhindre selvinjeksjon følges. Selvinjeksjon ved maskin vil ofte føre til injeksjon av full dose, dette øker faren for alvorlige bivirkninger.

Du har stukket deg, hva nå?

Ved selvstikk kan man få en alvorlig betennelsesreaksjon på stikksted. Alvorlighetsgraden av reaksjonen avhenger noe av hvor stor del av dosen som er injisert.

Alle selvstikk skal bli vurdert av lege, uavhengig av hvor mye vaksine som er injisert. Det er viktig at vaksinens pakningsvedlegg og informasjonsskriv om behandling blir overlevert til behandlende lege.

I noen tilfeller kan en alvorlig allergisk reaksjon oppstå i løpet av få minutter. I tillegg til reaksjon ved stikkstedet kan man da oppleve kløe i hud, øyne og munn. En følelse av varme og rødflammet utslett kan forekomme. Selve sjokkanfallet kan opptre i form av pustevansker og hjerteklapp. Personen kan oppleve oppkast og diare. I ekstreme tilfeller kan personen bli uklar og miste bevisstheten. Ved mistanke om sjokkreaksjon skal førstehjelp iverksettes og lege skal kontaktes umiddelbart, eventuelt kan man kontakte 113.

Førstehjelp ved alvorlig allergisk reaksjon etter selvstikk

Person skal overvåkes nøye inntil legebehandling. Ved oppkast skal personen legges i stabilt sideleie, ellers kan gjerne ryggeleie med beina høyt benyttes. Ved pustevansker skal overkroppen heves ca 20°. Personen skal holdes i ro og bæres ved forflytning.

OBS! En person som har blitt selvinjisert skal aldri være alene.

Informasjon til lege

Vaksiner fra Vaxxinova som er beregnet for stikk inneholder formalininaktiverte bakterier og en oljeadjuvans (mineralolje eller vegetabilsk olje).

Ved selvstikk kan operatøren få anafylaktisk reaksjoner som krever øyeblikkelig behandling etter vanlige retningslinjer. Avhengig av dose og lokalisasjon av stikk kan varierende reaksjoner oppstå. Mest vanlige reaksjoner er smerter, lett hevelse og infiltrasjon rundt stikksår. Ved slike reaksjoner har dosen mest sannsynlig vært liten og dette krever vanligvis ingen behandling.

Når hele dosen (0.05-0.1 ml) har blitt injisert kan det oppstå lokal hevelse med smerter som sprer seg til hele hånden og deler av underarmen. I noen tilfeller kan også lymfeknuter i armhule bli involvert i form av hevelser og smerte. I slike tilfeller må en nøye undersøkelse gjennomføres.

Behandlingsanbefalinger

1. Ved mer alvorlig reaksjoner vil det være riktig med tidlig kirurgisk intervensjon siden mineralolje er vevstoksisk og kan gi toksisk ødem med nekrose. Bred åpning ved innstikkstedet og nøye skylling for å fjerne oljen er nødvendig. I noen tilfeller har amputasjon vært nødvendig på grunn av forsinket behandling, derfor må selvstikk tas alvorlig og en nøye oppfølging er anbefalt. Ved kirurgisk intervensjon kan antibiotika vurderes hvis nødvendig. Stivkrampesprøyte er ikke indisert.
2. Sammen med lokale reaksjoner kan det i noen tilfeller utvikle seg et sykdomsbilde som er preget av slapphet, hodepine, svimmelhet og muskelsmerter. Dette er på grunn av endotoksiner i vaksinen og behandling med antiflogistika kan ha effekt.
3. Ved injeksjon av fiskevaksine i finger eller hånd skal skaden vurderes av kirurg i løpet av noen timer. Incisjon og skylling vil ofte være indisert.
4. Dersom det skulle oppstå et mistenkt tilfelle av anafylaksi bør det utredes grundig i ettertid. Best gjøres det ved seksjon for klinisk spesialallergologi ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen

Dette skrivet er bare ment som en veiledning for behandling, og det er alltid behandlende lege som har ansvar for hvilken behandling som iverksettes.

Etterkontroll

Etter vaksinerings

Kontroll for feilstikk og riktig deponering av vaksine bør gjøres under vaksinerings på vaksinasjonsdag. Vi anbefaler at dette gjøres for alle vaksinatører som utfører vaksinasjon.

Kontroll av bivirkninger før sjøutsett

Evalueringsskjema for vaksineringsreaksjoner medfølger denne manualen som vedlegg, men kan også lastes ned fra vår hjemmeside. Gradering/scoring av sammenvoksinger (adheranser), melanin og vaksinerester hos rognkjeks etter IP-injeksjon er beskrevet i følgende avsnitt.

Veileder for scoring av bivirkninger

Lokalisering av adheranser

Lokalisering	Beskrivelse
Lok. 1	Kraniale deler av bukhulen, inkludert svelg, dorsal del av lever samt fremre del (halvdel) av svømmeblære avgrenset av bakre kant av lever.
Lok. 2	Dorsale deler av bukhulen fra bakkant av lever mot svømmeblære inkludert baktarm.
Lok. 3	Ventrale deler av buk, deler av bukhulen som ikke dekkes av lokalisering 1 og 2.



Bilde 9. Lokalisering 1, 2 og 3 i buk.

Vaksinerester

Grad	Beskrivelse
0	Ingen synlige vaksinerester.
1	Små dråper med vaksinerester, begrenset i antall og utstrekning.
2	Flere små dråper med vaksinerester over et større område og/eller større vaksinerester/depot som lett rives opp ved obduksjon/undersøkelse.
3	Fritflytende vaksinerester, som om fisken var nyvaksinert.

Beskrivelse av gradering/scoring adheranser fra 0 til 6

Grad	Beskrivelse
0	Ingen synlige forandringer i bukhulen.
1	Svake sammenvoksinger i et begrenset område, ofte som bindevevstråder rundt injeksjonssted. Lett å løsne.
2	Moderate sammenvoksinger mellom organ og/eller mellom organ og bukvegg. Større utbredelse og/eller sitter fastere enn grad 1. Lett å løsne.
3	Tydelige sammenvoksinger mellom organ og/eller mellom organ og bukvegg. Lever og/eller svømmeblære kan være festet til organ. Sammenvoksinger sitter faster og/eller har større utbredelse enn grad 2.
4	Til dels kraftige sammenvoksinger mellom organ og/eller mellom organ og bukvegg. Involverer store deler av bukhulen. Sammenvoksinger er vanskelig å løsne uten å skade organ og/eller bukhinne. Organ kan fremstå som en pakke og granulom kan finnes i avgrensede områder.
5	Som for grad 4, men med større utbredelse. Bukhinne skades ved fjerning av organ. Tilstedeværelse av granulom i organ og/eller mellom organ og bukvegg.
6	Som for grad 5, men involverer alle organer i bukhulen. Tilstedeværelse av store granulom i organ, eller mellom organ og bukvegg. Organpakke lar seg ikke fjerne uten tydelige skader på bukhinne og filet.



Bilde 10. Vaksinerester grad 2 med lokalitet 3. Depot av vaksine kan bli sett i et større område. Sammenvoksinger av grad 3 observeres over et større område og sitter fast over magesekk og tarm.

Melanin organ

Grad	Beskrivelse
0	Ingen synlig melanin på indre organ.
1	Synlig melanin i små mengder og i avgrenset område.
2	Mye melanin i avgrenset område eller moderat melanin over større område.
3	Mye melanin på eller i organ, over store områder/alle organ.

Melanin bukhinne/muskel


Grad	Beskrivelse
0	Ingen synlig melanin på bukhinne.
1	Synlig melanin i små mengder og i avgrenset område, lar seg enkelt fjerne.
2	Mye melanin i avgrenset område eller moderat melanin over større område, vanskelig å fjerne uten å skade bukhinne.
3	Mye melanin på eller i filet, over store områder. Lar seg ikke fjerne uten å skade bukhinne/muskel.

Vedlegg


Mottakskontroll			
Mottatt		Antall enheter	
Vaksine		Batch nr.	
Reseptnummer		Holdbarhetsdato	
Vurdering av vaksine <u>Ved mottak:</u> Sjekk om flaskene er intakte og at emulsjonsbrudd ikke forekommer. <u>Før bruk:</u> Som ved mottak. Kontroll av vaksiner må gjøres før risting.		Faseseparasjon av olje er normalt etter lagring. Olje kan sees som et tynt lag øverst (bilde 1). I noen tilfeller kan emulsjonssprekk forekomme, da vil man kunne se et tykt lag med blakket eller brunt sjikt øverst i flasken. Tre lag/faser i flasken indikere også emulsjonssprekk (bilde 2). Vaksinen skal da ikke benyttes. Det er viktig å riste vaksinen rett før bruk for å sikre at den er homogen (bilde 3). Er du usikker så ta gjerne kontakt med oss på epost: teknisk@vaxxinoa.no	
Vurdering ved mottak	Ok ☐ Ja ☐ Nei	Dato:	
Vurdering før bruk	Ok ☐ Ja ☐ Nei	Dato:	



Faseseparasjon før risting pga lagring



Sprukket vaksine



Homogen vaksine etter risting

Ved avvik meld ifra til driftsleder og forskrivende veterinær/fiskehelsebiolog. Vaksiner oppbevares i kjøleskap til eventuelle avvik er vurdert.

Kommentarer

.....
signatur

Kontroll ved oppstart vaksinerings

Dato	Vaksine
Anlegg	Batch
Vaksinasjonsteam	Nålelengde/diameter

Fiskegruppe	Temperatur
Snittstørrelse	Helsestatus
Fra kar	Til kar

Fisk nr.	Vekt	Lengde	Stikkpunkt	Vaksine i buken	Kommentar
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Kommentarer

Tilsynsveterinær/fiskehelsebiolog:

Evaluering vaksinereaksjon rognkjeks

Dato:			
Undersøkt av:			
Anlegg/Lokalitet:			
Kar/Merd:			
Vaksinert dato:		Vekt:	
Sjøsatt dato:		Vekt:	
Vaksine:	Batch:	IP/IMM:	

Fisk nr.	Vekt	Lengde	Adh. (0-6)	Lok. (1/2/3)	Melanin O/F (0-3)	V.rest (0-3)	Kommentar
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Kommentarer

.....
Veterinær/fiskehelsebiolog

.....
Dato

IP vaksinerings rognkjeks

Stikkpunkt:

- Midtlinje
- Midtveis mellom sugekopp og gatt

Nåletykkelse: 0.6 (0.5)

Nålelengde:

Vekt	Lengde
5-7 g	3-4 mm
8-15 g	4-5 mm
14-18 g	5-6 mm
19-30 g	6 mm
> 30 g	7 mm

Nålen stikkes i tilnærmet 90 graders vinkel

Enkelt dose: 0.05 ml

Temperatur: 4-12 °C

